

## Окрашивание клеток флуоресцентным красителем для нуклеиновых кислот **LUCS® 5**

LUCS® 5 (1,5-бис{[2-(ди-метиламино)этил]амино}-4,8-дигидроксиантрацен-9,10-дион) — проникающий в клетки флуоресцентный ДНК краситель дальнего красного диапазона для визуализации и анализа живых и фиксированных клеток. LUCS® 5 является полным структурным аналогом красителя DRAQ5®.

LUCS® 5 способен легко проникать через клеточные мембраны и внедряться между А и Т основаниями двуцепочечной ДНК (дцДНК). Краситель имеет высокое сродство к дцДНК и лишь незначительно связывается с РНК и мтДНК. При этом LUCS® 5 не усиливает флуоресценцию при связывании ДНК, и измеренная флуоресценция красителя пропорциональна и стехиометрична количеству ядерной ДНК в клетке.

Благодаря проницаемости в клетки LUCS® 5 может быть использован для определения содержания ДНК и изучения клеточного цикла, однако, он не подходит для оценки жизнеспособности клеток. Как и другие проникающие в клетки интеркалирующие ДНК красители, LUCS® 5 может ингибировать клеточные деления в долгосрочных экспериментах, поэтому данный эффект необходимо исследовать перед основным экспериментом.

В микроскопии и многопараметрическом анализе LUCS® 5 может быть использован в качестве ядерного контрастирующего красителя как для живых, так и для фиксированных образцов. В проточной цитометрии LUCS® 5 позволяет напрямую различать клетки крови и костного мозга без предварительного лизиса, фиксации, пермеабиллизации или обработки РНКазой эритроцитов.

LUCS® 5 имеет пики поглощения при 603 нм и 646 нм и пик эмиссии при 697 нм (при связывании с дцДНК). Таким образом, данный краситель спектрально совместим с наиболее распространенными метками, такими как GFP, FITC, R-PE или RFP. LUCS® 5 также обладает высокой фотостабильностью и не проявляет эффекта фотообесцвечивания при визуализации.

### Lumiprobe Corporation

201 International Circle, Suite 135  
Hunt Valley, Maryland 21030  
USA  
Phone: +1 888 973 6353  
Fax: +1 888 973 6354  
Email: [order@lumiprobe.com](mailto:order@lumiprobe.com)

### Lumiprobe GmbH

Feodor-Lynen-Strasse 23  
30625 Hannover  
Germany  
Phone: +49 511 16596811  
Fax: +49 511 16596815  
Email: [de@lumiprobe.com](mailto:de@lumiprobe.com)

### Lumiprobe RUS Ltd

Kotsyubinsky street, 4  
121351 Moscow  
Russian Federation  
Phone: +7 800 775 3271  
Email: [ru@lumiprobe.com](mailto:ru@lumiprobe.com)

## Прежде чем начать

- Раствор LUCS<sup>®</sup> 5 следует хранить при температуре 2—8°C. НЕ замораживайте раствор! При замораживании LUCS<sup>®</sup> 5 может выпасть из раствора в осадок, который затем сложно повторно растворить.
- Азид натрия препятствует окрашиванию LUCS<sup>®</sup> 5, поэтому, рекомендуется проводить окрашивание в буфере Дульбекко (DPBS), PBS или культуральной среде, не содержащей азид натрия.
- Обычно используемая концентрация красителя для окрашивания клеток составляет 5–20 мкМ. Рабочее разведение зависит от типа и плотности клеток и должно определяться экспериментально.
- Оптимальная плотность клеток и продолжительность окрашивания для анализа содержания ДНК может варьировать в зависимости от типа клеток. Протокол окрашивания необходимо оптимизировать в пилотных экспериментах для достижения наилучшего результата.
- Комплекс LUCS<sup>®</sup> 5 с дцДНК обладает яркой флуоресценцией в ядре, при этом несвязанный краситель может тускло флуоресцировать в цитоплазме, что позволяет сегментировать в клетке цитоплазматический и ядерный компартменты.

## Окрашивание клеток

### Окрашивание живых клеток для визуализации ядер

1. Культивируйте клетки на стерильных покровных стеклах. Адгезионные культуры клеток можно окрашивать непосредственно на покровном стекле.
2. Разбавьте раствор LUCS<sup>®</sup> 5 до концентрации 5–20 мкМ в полной культуральной среде или другом буфере, не содержащем азидов, непосредственно перед использованием.
3. Добавьте раствор LUCS<sup>®</sup> 5 к образцам и инкубируйте при 37°C в течение 5–30 мин в темноте.
4. Аспирируйте красящий раствор LUCS<sup>®</sup> 5 и дважды промойте клетки 1× PBS.  
*(Опционально)* Клетки можно анализировать без предварительной отмывки, однако это может увеличить фон от несвязанного красителя.
5. Для флуоресцентной микроскопии поместите клетки под покровное стекло, используя [закрывающую среду](#).
6. Для визуализации рекомендуется использовать 715LP или более длинноволновый фильтр. Краситель также хорошо детектируется в фильтрах, обычно используемых для детекции AF 647 (например, 660/20 или 692/40 нм).

## Окрашивание фиксированных клеток для визуализации ядер

1. Культивируйте клетки на стерильных покровных стеклах. Адгезионные культуры клеток можно окрашивать непосредственно на покровном стекле.
2. Фиксируйте и пермеабелизируйте клетки при необходимости.
3. Разбавьте раствор LUCS<sup>®</sup> 5 до концентрации 5–20 мкМ в 1× PBS или другом буфере, не содержащем азидов, непосредственно перед использованием.
4. Добавьте раствор LUCS<sup>®</sup> 5 к образцам и инкубируйте 5–30 мин при комнатной температуре в темноте.
5. Промойте образцы один раз в 1× PBS.  
*(Опционально)* Клетки также можно анализировать без промывания, но это может увеличить фон от несвязанного красителя.
6. Для флуоресцентной микроскопии поместите клетки под покровное стекло, используя [закрывающую среду](#).
7. Для визуализации рекомендуется использовать 715LP или более длинноволновый фильтр. Краситель также хорошо детектируется в фильтрах, обычно используемых для детекции AF 647 (например, 660/20 или 692/40 нм).

## Окрашивание живых клеток для анализа содержания ДНК методом проточной цитометрии

1. Получите суспензионную культуру клеток.
2. Ресуспенсируйте клетки в концентрации  $0,5 \times 10^6$  клеток/мл или меньше в 20 мкМ растворе LUCS<sup>®</sup> 5, приготовленном на полной культуральной среде или другом буфере, не содержащем азидов.
3. Инкубируйте клетки при 37°C в течение 5–15 мин в темноте.
4. Осадите клетки центрифугированием при 400 g в течение 3–4 мин при комнатной температуре и аспирируйте окрашивающий раствор LUCS<sup>®</sup> 5.
5. Ресуспенсируйте клетки в 1× DPBS, после чего сразу приступайте к анализу методом проточной цитометрии. Клетки также можно анализировать без промывания, однако, это может снизить разрешение гистограммы содержания ДНК.
6. Анализируйте клетки на цитометре, оснащенный красным лазером 633 нм. При анализе клеточного цикла, детекция в канале AF 700 с фильтрами 680LP или 715LP может помочь в разрешении эмиссионных пиков.  
*(Опционально)* LUCS<sup>®</sup> 5 также можно детектировать на проточном цитометре с использованием синего лазера с длиной волны 488 нм.

## **Окрашивание фиксированных клеток для анализа содержания ДНК методом проточной цитометрии**

1. Получите суспензионную культуру клеток.
2. Зафиксируйте клетки на льду 70–80% ледяным этанолом в течение 30 мин.
3. Промойте клетки один раз 1× DPBS.
4. Разбавьте раствор LUCS<sup>®</sup> 5 до концентрации 20 мкМ в 1× DPBS или другом буфере, не содержащем азидов, непосредственно перед использованием.
5. Окрашивайте клетки в концентрации 0,5×10<sup>6</sup> клеток/мл или меньше в течение 5–15 мин при комнатной температуре в темноте.
6. Никакой дополнительной промывки клеток перед анализом не требуется.
7. Анализируйте клетки на цитометре, оснащённом красным лазером 633 нм. При анализе клеточного цикла, детекция в канале AF 700 с фильтрами 680LP или 715LP может помочь в разрешении эмиссионных пиков.  
*(Опционально)* LUCS<sup>®</sup> 5 также можно детектировать на проточном цитометре с использованием синего лазера с длиной волны 488 нм.

## **Спектральные свойства:**

### **Возбуждение:**

- Максимумы при 603 нм и 646 нм;
- Оптимальная линия 647 нм;
- Также можно использовать линии 488, 514, 568 и 633 нм;
- Двухфотонное возбуждение при 1047 нм.

### **Эмиссия (зависит от прибора):**

- Максимумы при 681 нм (свободный краситель)/697 нм (в комплексе с дцДНК);
- Обнаружение от 665 нм до ближнего инфракрасного диапазона (NIR);
- Эмиссионные фильтры 695L, 715LP или 780 LP.

---

DRAQ5<sup>™</sup> является зарегистрированной торговой маркой BioStatus Ltd.