

## Суанине3 фосфорамидит

<http://ru.lumiprobe.com/p/cy3-phosphoramidite-5>

Суанине3 — это флуорофор, широко используемый в молекулярно-биологических экспериментах, в том числе для мечения олигонуклеотидов и их последующей детекции. Суанине3 имеет, с максимум флуоресценции 570 нм, в желтой области спектра.


Суанине3 фосфорамидит 5' используется в олигонуклеотидном синтезе для получения меченых Суанине3 олигонуклеотидов на 5'-конце. Реагент совместим с различными олигонуклеотидными синтезаторами.

Данный фосфорамидит может применяться для синтеза флуоресцентно-меченых праймеров, гибридизационных зондов типа TaqMan и Molecular Beacon. Такие меченые зонды могут детектироваться в мультиплексной ПЦР в реальном времени в канале TAMRA.

## Рекомендации по использованию реагента:

Конденсация: 3 минуты. Используйте 0,02М раствор йода на стадии окисления, чтобы избежать разложения цианинового красителя.

Деблокирование: При комнатной температуре с использованием 30% водного раствора аммиака. Рекомендуется использовать нуклеиновые основания с лабильными защитными группами для проведения деблокирования не более двух часов при температуре ниже 55°C. Допустимо использование АМА (30% водного раствора аммиака / 40% водного метиламина 1:1 (v/v)) в течение 10 минут при 65°C при наличии ацетилдезоксицитидина. Если во время синтеза используется дезоксигуанидин с диметилформаминаминовой защитной группой, деблокируйте 30% водным раствором аммиака в течение 2 часов при 65°C; при использовании дезоксигуанидина с изобутирильной защитной группой деблокировать рекомендуется в течение 24-36 часов при комнатной температуре.



Структура Суанине3 фосфорамидит

### Общие свойства

Вид продукта:	красный порошок
Молекулярная масса:	841.81
Брутто-формула:	C <sub>45</sub> H <sub>65</sub> N <sub>3</sub> BF <sub>4</sub> O <sub>3</sub> P
Растворимость:	хорошая в ацетонитриле и дихлорметане
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H, <sup>31</sup> P, ВЭЖХ-МС (80%)
Условия хранения:	Хранение: 12 месяцев (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

### Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, нм:	555
$\epsilon$ , л·моль <sup>-1</sup> ·см <sup>-1</sup> :	150000
Длина волны флуоресценции, нм:	570
Квантовый выход флуоресценции:	0.31
CF <sub>260</sub> :	0.04
CF <sub>280</sub> :	0.09

### **Олигонуклеотидный синтез**

Растворитель:	ацетонитрил
Условия конденсации:	рекомендуемое время конденсации 6 мин
Условия деблокирования:	48 часов, +4°C или синтез с феноксиацильными защитными группами; допустимо 24 ч при комнатной температуре

Cy<sup>™</sup> — зарегистрированная торговая марка Cytiva в некоторых странах.