**Lumiprobe Corporation**
115 Airport Dr Suite 160
Westminster, Maryland 21157
USA
Телефон: +1 888 973 6353
Факс: +1 888 973 6354
Email: order@lumiprobe.com

# DAPI, синий флуоресцентный краситель нуклеиновых кислот

http://ru.lumiprobe.com/p/dapi-nucleic-acid-stain

DAPI (4',6-диамидино-2-фенилиндол) — синий флуоресцентный краситель, который прочно связывается с участками ДНК, богатыми аденином и тимином. Он широко используется в флуоресцентной микроскопии и проточной цитометрии для контрастирования ядер, а также для окрашивания хромосом. DAPI обычно используют для окрашивания фиксированных клеток, поскольку краситель не проникает через клеточную мембрану. Однако, при использовании в высоких концентрациях, краситель может начать проникать в живые клетки.

DAPI демонстрирует ~20-кратное усиление флуоресценции при связывании с двухцепочечной ДНК с максимумами поглощения при 355 нм и испускания при 460 нм. DAPI также может связываться с РНК, однако при этом он не сильно флуоресцирует. При связывании с РНК спектр излучения DAPI смещается к 500 нм.

Флуоресценция DAPI немного перекрывается со спектрами зеленых флуоресцентных молекул, таких как флуоресцеин и GFP. Используйте спектральное разделение, если требуется чрезвычайно точный анализ изображения.

DAPI в несколько раз чувствительнее бромистого этидия при окрашивании ДНК в агарозных гелях. Его можно использовать для фотопринтинга ДНК, для обнаружения отожженных зондов в блоттинге путем специфической визуализации двухцепочечного комплекса. Также окрашивание с помощью DAPI — чувствительный и специфичный метод обнаружения микоплазмы.

Рабочая концентрация DAPI для окрашивания эукариотических клеток обычно составляет 1 мкг/мл, но зависит от типа и плотности клеток, поэтому точное разведение красителя определяется экспериментально.




**Структура DAPI**




**Спектры поглощения и эмиссии DAPI**

**Общие свойства**

| | |
|---|---|
| Вид продукта: | жёлтое твёрдое вещество или раствор |
| Молекулярная масса: | 350.25 |
| CAS-номер: | 28718-90-3 |
| Брутто-формула: | $C_{16}H_{17}Cl_2N_5$ |
| Растворимость: | хорошая в ДМФА, ДМСО |
| Контроль качества: | ЯМР $^1$H и ВЭЖХ-МС (95+%) |
| Условия хранения: | 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги. |

| | |
|---|---|
| Юридическое заявление: | Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях. |

**Спектральные свойства**

| | |
|---|---|
| Максимум возбуждения/поглощения, нм: | 355 |
| ε, л·моль$^{-1}$·см$^{-1}$: | 28800 |
| Длина волны флуоресценции, нм: | 460 |