


## ДБЦО-STP-эфир

<http://ru.lumiprobe.com/p/dbco-stp-ester>

Сульфотетрафторфениловый эфир дибензоциклооктина (STP-эфир ДБЦО) — это растворимый в воде реагент, который используется для модификации пептидов, антител, белков и других биомолекул, содержащих  $-NH_2$  группу.

STP-эфиры гораздо медленнее гидролизуются по сравнению с NHS-эфирами, что позволяет более эффективно проводить модификацию биомолекул в водной среде.

Дибензоциклооктиновый фрагмент (ДБЦО, DBCO), также известный как ADIBO или DIBAC, является наиболее часто используемым субстратом для безмедных клик-реакций, которые прототируются напряжением цикла. В такой реакции производные DBCO в отсутствие  $Cu(I)$  катализатора реагируют с биомолекулами, функционализированными азидной группой, приводя к образованию стабильных триазолов.



### Структура ДБЦО активированного эфира (STP-эфира)

#### Общие свойства

Вид продукта:	бежевый порошок
Молекулярная масса:	569.46
Брутто-формула:	$C_{26}H_{16}NF_4O_6SNa$
Растворимость:	хорошая в воде, дихлорметане, ДМФ, ДМСО
Контроль качества:	ЯМР $^1H$ , ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 12 месяцев (с момента доставки) при $-20^\circ C$ в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели <i>in vitro</i> , для людей или животных или в коммерческих целях.