


## HMRhoNox-M, флуоресцентный индикатор для Fe(II)

<http://ru.lumiprobe.com/p/hmrhonox-m>


HMRhoNox-M (также известный как LysoRhoNox) — Fe<sup>2+</sup>-селективный флуоресцентный индикатор, основанный на контролируемой N-оксидом спироциклизации тетраметил-гидроксиметилпродамина.

В отсутствие Fe<sup>2+</sup> HMRhoNox-M находится в нефлуоресцентной спироциклической форме, демонстрируя лишь незначительную флуоресценцию в водных буферах и при физиологическом значении pH. Добавление Fe<sup>2+</sup> вызывает 60-кратное увеличение флуоресценции при 575 нм за счет дезоксигенации диалкиламиногруппы и перехода индикатора в открытую флуоресцентную форму. HMRhoNox-M реагирует на Fe<sup>2+</sup> дозозависимым образом.




Флуоресцентный ответ HMRhoNox-M высокоизбирателен к Fe<sup>2+</sup> и не возникает на ионы других переходных металлов, включая Fe<sup>3+</sup>, а также ионы щелочных и щелочноземельных металлов.

HMRhoNox-M — проникающий в клетки и локализующийся в основном в лизосомах индикатор. Он подходит для мониторинга изменений содержания эндогенного лабильного железа в живых клетках, в том числе захвата и транспорта железа трансферрином.



Структура HMRhoNox-M



Спектры поглощения и эмиссии HMRhoNox-M

### Общие свойства

Вид продукта:	бежево-розоватые кристаллы
Молекулярная масса:	388.47
Брутто-формула:	C <sub>24</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Растворимость:	ДМСО
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H и ВЭЖХ-МС (95+%)
Условия хранения:	24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.

Юридическое заявление:

Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели *in vitro*, для людей или животных или в коммерческих целях.

**Спектральные свойства**

Максимум возбуждения/поглощения, нм: 555

Длина волны флуоресценции, нм: 575