


## Сукцинилацетон

<http://ru.lumiprobe.com/p/succinylacetone>

Сукцинилацетон, или 4,6-диоксогептановая кислота, является аномальным метаболитом тирозина. Синтез этой среднепечечной кетокислоты в организме обусловлен сниженной активностью фермента фумарилацетоацетат-гидролазы. Сукцинилацетон является ацидогеном, его высокие концентрации могут привести к метаболическому ацидозу, что приводит к поражению печени, почек, сердца, нервной системы. Сукцинилацетон проявляет себя как онкометаболит, поскольку у пациентов с высоким уровнем этого соединения часто развивается гепатоцеллюлярная карцинома. Сукцинилацетон широко используется в исследованиях в качестве ингибитора фермента дегидратазы 5-аминолевулиновой кислоты (ALAD), который играет ключевую роль в биосинтезе гема.

Продукт используется в основном как контроль для МС-МС.



**Структура Сукцинилацетона**

### Общие свойства

Вид продукта:	белое твердое вещество
Молекулярная масса:	158.15
CAS-номер:	51568-18-4
Брутто-формула:	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>
Растворимость:	в воде
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H , ЯМР <sup>13</sup> C и ГХМС (95+%)
Условия хранения:	24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.