

ТЦО-ПЭГ4-NHS эфир (аксиальный изомер)


<http://ru.lumiprobe.com/p/tco-peg4-nhs-axial-isomer>

ТЦО-ПЭГ4-NHS эфир — бифункциональный линкер, содержащий ПЭГ4 (тетраэтиленгликоль), концевые группы которого функционализованы транс-циклооктенем (ТЦО) и N-гидроксисукцинимидной группой.

Спейсер ПЭГ4 увеличивает растворимость реагента в водной среде и обеспечивает длинное и гибкое присоединение функциональных групп, сводящее к минимуму стерические затруднения, возникающие при лигировании.

Остаток N-гидроксисукцинимиды (NHS) используется для связывания с первичными аминами белков, пептидов, модифицированных амином олигонуклеотидов и другими молекулами, содержащими аминами.

Транс-циклооктен легко реагирует с тетразинами посредством реакции Дильса-Альдера с обращенными электронными требованиями (inverse electron-demand Diels-Alder cycloaddition, IEDDA). ТЦО-тетразиновое лигирование обладает сверхбыстрой кинетикой, селективностью и долговременной стабильностью в воде, что важно в применениях с использованием низких концентраций реагентов, таких как конъюгации белок-белок и т. д.



Структура: ТСО-PEG4-NHS эфир

Общие свойства

Вид продукта:	бесцветный сироп
Молекулярная масса:	514.57
CAS-номер:	1621096-79-4
Брутто-формула:	$C_{24}H_{38}N_2O_{10}$
Растворимость:	ДМСО, ДМФ, ТГФ, ацетонитрил, дихлорметан
Контроль качества:	ЯМР 1H и ВЭЖХ-МС (95+%)
Условия хранения:	12 месяцев (с момента доставки) при $-20^{\circ}C$ в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели <i>in vitro</i> , для людей или животных или в коммерческих целях.